

Алтайский филиал географического общества СССР

Алтайский государственный университет

**Алтайское краевое правление НТО
лесной промышленности и лесного хозяйства**

Алтайский краевой совет ВООП

**БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

(Тезисы докладов к конференции)

БАРНАУЛ — 1984

Алтайский филиал географического общества СССР

Алтайский государственный университет

**Алтайское краевое правление НТО
лесной промышленности и лесного хозяйства**

Алтайский краевой совет ВООП

**БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(Тезисы докладов к конференции)**

Барнаул 1984

В тезисах докладов изложены как общие вопросы теории и практики использования биологических ресурсов, так и конкретные данные о ресурсах растительного и животного мира Алтайского края и вопросы охраны биологических ресурсов.

Редакционная коллегия:

И.А.Вавилихин, А.В.Забелина, Э.А.Ирисов, Н.Л.Ирисова,
Т.А.Пудовкина, В.С.Ревякин (председатель), Н.В.Ревякина,
К.В.Топоров, Б.П.Чураков.

Ответственный за выпуск - доктор географических наук

В.С.Ревякин

К ВОПРОСУ О ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ АРЕАЛА СТЕПНОЙ ГАДЮКИ

В.А.Яковлев

Во время экспедиции по Алтаю в 1898 г. Н.Ф.Кашенко собрал восемь экземпляров степной гадюки в Уймонской долине и в устье притока Катуня — Сок-Ярык (Никольский, 1916). С.М.Чугунов (1910) нашел ее у с.Чемал. Эти сведения, подтверждающие обитание змей во внутренних степях Алтайской горной страны, послужили П.В.Терентьеву и С.А.Чернову (1949) основанием для проведения восточной границы ареала названного вида между 88 и 89° восточной долготы. Позднее З.С.Баркаган и П.П.Перфильев (1967) писали, что на Алтае степная гадюка встречается только в степных районах южной и юго-западной части края. Несмотря на это, в справочнике-определителе А.Г.Банникова и др. (1971) карта распространения этого вида была дана в соответствии со схемой Терентьева и Чернова. В 1977 г. вышел "Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР" (Банников и др., 1977), авторы которого провели восточную границу ареала этой змеи значительно западнее, оставив под вопросом находку рептилий в Рахмановских Ключах В.В.Сапожниковым (Кашенко, 1909) и исключая таким образом степную гадюку из фауны Горного Алтая. Дальнейшие исследования подтвердили обитание названного вида в степях межгорных котловин. В 1974 г. степная гадюка была отловлена нами в долине основного притока Талецкого озера р.Чульшман в окрестностях кордона Чодро (Яковлев, 1977). В 1979 г. там же, а в 1981 г. в 40 км ниже по долине реки в урочище Катуюрык добыто еще две змеи. Эти экземпляры, так же как отловленный в 1980 г. в устье Большого Яломана (приток Катуня) Н.П.Малковым, были переданы в коллекцию герпетологического отделения Зоологического института АН СССР. Ранее Н.П.Малковым (1979) степные гадюки неоднократно отмечались в нижнем течении р.Аргут, а позднее (Малков, 1981) — в межгорной котловине Той-Самаха в верховьях этой же реки, в Уймонской, Катандиной и Курайской степях.

Эти данные подтверждают, что степная гадюка является немногочисленным, но постоянным обитателем межгорных котловин Алтая и восточной границей ее ареала следует признать границу, проведенную П.В.Терентьевым и С.А.Черновым (1949).